

FRONT PANEL PATIENT CARD

9 pt

RMA Version: 12/2024

12 pt

Patiëntenkaart voor

Carte patient pour

Patientenkarte für

30 pt

Topamax

17 pt

Voor vrouwen en

meisjes die zwanger

kunnen worden

Geboortebeperking

en voorkoming van

zwangerschap

16 pt

Wat moet u weten

• Topamax is een geneesmiddel voor

epilepsie en migraine.

• Topamax kan de gezondheid van een

ongeboren kind ernstig schaden als het

gebruikt wordt tijdens de zwangerschap.

10 pt

Wat moet u doen

• Lees vóór gebruik de bijsluiter en de

patiëntengids zorgvuldig door

• Gebruik tijdens uw behandeling met

topiramaat en tot minstens 4 weken

na uw laatste dosis topiramaat zeer

effectieve voorbehoedsmiddelen. Uw arts

zal u advies geven over de methode die

voor u het meest geschikt is.

16 pt

• Ga minstens eenmaal per jaar naar uw

arts om uw behandeling opnieuw te

beoordelen.

• Als u denkt dat u zwanger bent

geworden, praat dan direct met uw arts.

• Als u zwanger wilt worden, stop dan niet

met het gebruik van voorbehoedsmiddelen

tot u met uw arts hebt gepraat.

10 pt

• Als u epilepsie heeft, mag u niet stoppen

met het gebruik van topiramaat tenzij uw

arts zegt dat u dit moet doen, omdat uw

aandoening anders erger kan worden.

Vraag aan uw arts om een patiëntengids.

Bewaar deze kaart.

17 pt

Pour les femmes

et les filles en âge

de procréer

Contraception et

prévention de la

grossesse

16 pt

Ce que vous devez savoir

• Topamax est un médicament pour

l'épilepsie et la migraine.

• Topamax peut gravement nuire à un

enfant à naître s'il est pris pendant la

grossesse.

10 pt

Ce que vous devez faire

• Lisez attentivement la notice et le guide

patient avant d'utiliser ce médicament.

• Utilisez une méthode de contraception

hautement efficace pendant toute la

durée de votre traitement par topiramate

et pendant au moins 4 semaines

après la dernière dose de topiramate.

Votre médecin vous conseillera sur la

méthode la plus adaptée pour vous.

BACK PANEL PATIENT CARD

10 pt

• Consultez votre médecin spécialiste au

moins une fois par an pour réévaluer

votre traitement.

• Si vous pensez être enceinte, parlez-en

immédiatement à votre médecin.

• Si vous envisagez d'avoir un enfant,

n'arrêtez pas votre méthode de

contraception avant d'avoir parlé à votre

médecin.

16 pt

• Si vous êtes épileptique, n'arrêtez pas

d'utiliser le topiramate sauf indication

contraire de votre médecin, car cela

pourrait aggraver votre épilepsie.

Demandez à votre médecin de vous

donner le guide patient.

Conservez cette carte.

17 pt

für Frauen und Mädchen,

die schwanger werden

können

Empfängnisverhütung

und Schwangerschaft.

16 pt

Was Sie wissen müssen

• Dieses Arzneimittel enthält Topiramat

und wird zur Behandlung von

Epilepsie oder zur Vorbeugung von

Migränekopfschmerzen eingesetzt

• Topamax kann ein ungeborenes Kind

schwerwiegend schädigen, wenn

es während der Schwangerschaft

eingegenommen wird.

10 pt

Was Sie tun müssen

• Lesen Sie die Packungsbeilage und

den Patientinnenleitfaden vor der

Einnahme sorgfältig durch.

• Sie müssen während der Behandlung mit

Topiramat und mindestens 4 Wochen

nach der letzten Einnahme hochwirksame

Verhütungsmittel anwenden. Ihr Arzt

wird Sie über die für Sie am besten

geeignete Verhütungsmethode beraten.

16 pt

• Suchen Sie Ihren Arzt mindestens

einmal im Jahr auf, um Ihre Behandlung

zu überprüfen.

• Wenn Sie glauben, schwanger zu sein,

sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt.

• Wenn Sie darüber nachdenken, ein

Kind zu bekommen, setzen Sie die

Empfängnisverhütung nicht ab, bevor

Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben.

10 pt

• Wenn Sie Epilepsie haben, setzen Sie

Topiramat nur auf Anweisung Ihres

Arztes ab, da sich Ihr Zustand sonst

verschlechtern kann.

Fragen Sie Ihren Arzt nach dem

Patientinnenleitfaden.

Bewahren Sie diese Karte auf.

12 pt

Patiëntenkaart voor

Carte patient pour

Patientenkarte für

30 pt

Topamax

MU_123532404.pdf - Page 3 of 4 - January 8, 2025 - 13:09:17