

Front Panel Backing Card

6 pt

RMA Version: 12/2024

BE

BE

NL

FR

12 pt

Patiëntenkaart voor

Carte patient pour

Patientenkarte für

24 pt

Topamax®

NL

15 pt

Patiëntenkaart voor Topamax -

Voor vrouwen en meisjes

die zwanger kunnen worden

Geboortebeperking en

voorkoming van zwangerschap

14 pt

Wat moet u weten

10 pt

• Topamax is een geneesmiddel voor epilepsie en migraine.

• Topamax kan de gezondheid van een ongeboren kind ernstig schaden als het gebruikt wordt tijdens de zwangerschap.

Wat moet u doen

• Lees vóór gebruik de bijsluiter en de patiëntengids zorgvuldig door

• Gebruik tijdens uw behandeling met topiramaat en tot minstens 4 weken na uw laatste dosis topiramaat zeer effectieve voorbehoedsmiddelen. Uw arts zal u advies geven over de methode die voor u het meest geschikt is.

• Ga minstens eenmaal per jaar naar uw arts om uw behandeling opnieuw te beoordelen.

• Als u denkt dat u zwanger bent geworden, praat dan direct met uw arts.

• Als u zwanger wilt worden, stop dan niet met het gebruik van voorbehoedsmiddelen tot u met uw arts hebt gepraat.

• Als u epilepsie heeft, mag u niet stoppen met het gebruik van topiramaat tenzij uw arts zegt dat u dit moet doen, omdat uw aandoening anders erger kan worden.

Vraag aan uw arts om een patiëntengids.

Bewaar deze kaart.

FR

Carte patient pour Topamax –

Pour les femmes et les filles en

âge de procréer

Contraception et prévention

de la grossesse

Ce que vous devez savoir

• Topamax est un médicament pour l'épilepsie et la migraine.

• Topamax peut gravement nuire à un enfant à naître s'il est pris pendant la grossesse.

Ce que vous devez faire

• Lisez attentivement la notice et le guide patient avant d'utiliser ce médicament.

• Utilisez une méthode de contraception hautement efficace pendant toute la durée de votre traitement par topiramate et pendant au moins 4 semaines après la dernière dose de topiramate. Votre médecin vous conseillera sur la méthode la plus adaptée pour vous.

Back Panel Backing Card

• Consultez votre médecin spécialiste au moins une fois par an pour réévaluer votre traitement.

• Si vous pensez être enceinte, parlez-en immédiatement à votre médecin.

• Si vous envisagez d'avoir un enfant, n'arrêtez pas votre méthode de contraception avant d'avoir parlé à votre médecin.

• Si vous êtes épileptique, n'arrêtez pas d'utiliser le topiramate sauf indication contraire de votre médecin, car cela pourrait aggraver votre épilepsie.

Demandez à votre médecin de vous donner le guide patient.

Conservez cette carte.

DE

Patientenkarte für Topamax –

für Frauen und Mädchen,

die schwanger werden können

Empfängnisverhütung und

Schwangerschaft.

Was Sie wissen müssen

• Dieses Arzneimittel enthält Topiramat und wird zur Behandlung von Epilepsie oder zur Vorbeugung von Migränekopfschmerzen eingesetzt

• Topamax kann ein ungeborenes Kind schwerwiegend schädigen, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird.

Was Sie tun müssen

• Lesen Sie die Packungsbeilage und den Patientinnenleitfaden vor der Einnahme sorgfältig durch.

• Sie müssen während der Behandlung mit Topiramat und mindestens 4 Wochen nach der letzten Einnahme hochwirksame Verhütungsmittel anwenden. Ihr Arzt wird Sie

über die für Sie am besten geeignete Verhütungsmethode beraten.

• Suchen Sie Ihren Arzt mindestens einmal im Jahr auf, um Ihre Behandlung zu überprüfen.

• Wenn Sie glauben, schwanger zu sein, sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt.

• Wenn Sie darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, setzen Sie die Empfängnisverhütung

nicht ab, bevor Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben.

• Wenn Sie Epilepsie haben, setzen Sie Topiramat nur auf Anweisung Ihres Arztes ab, da sich Ihr Zustand sonst verschlechtern kann.

Fragen Sie Ihren Arzt nach dem Patientinnenleitfaden.

Bewahren Sie diese Karte auf.

Patiëntenkaart voor

Carte patient pour

Patientenkarte für

Topamax®

MU_123532405.pdf - Page 3 of 4 - December 24, 2024 - 04:56:34