

Waarschuwingskaart voor patiënten

CARVYKTI® (ciltacabtagene autoleucel / cilta-cel)

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

NAAM VAN DE PATIËNT:

Contactpersoon voor noodgevallen

Verzorger van de patiënt

Naam: _____

Telefoonnummer: _____

Belangrijkste CAR-T-zorgverlener

Naam: _____

Telefoonnummer: _____

Ziekenhuis van de CAR-T-behandeling

Naam: _____

Telefoonnummer: _____

Belangrijke informatie voor patiënten

Draag deze kaart altijd bij u.

Laat deze kaart zien aan al uw zorgverleners.

Zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Na het CAR-T-infuus: blijf tenminste 4 weken in de buurt van het ziekenhuis waar u bent behandeld.

Bestuur geen voertuigen en gebruik geen gereedschap of machines tot ten minste 8 weken na uw infuus.

Lees de bijsluiter voor meer informatie.

Krijgt u nieuwe klachten? Met name de klachten die op deze kaart staan? Waarschuw dan onmiddellijk uw arts, verpleegkundige of een andere beschikbare zorgverlener.

Cilta-cel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken in verschillende delen van uw lichaam. Deze bijwerkingen kunnen tot levensbedreigende situaties leiden. Ze kunnen zelfs tot de dood leiden. Daarom moeten ze onmiddellijk worden behandeld.

Bijwerkingen die mild lijken, kunnen snel erger worden. De bijwerkingen kunnen met vertraging optreden tot weken na de infusie.

Bel onmiddellijk uw arts of zoek spoedeisende hulp als u één van de volgende klachten krijgt:

- Koorts (38 graden of hoger)
- Koude rillingen
- Uw hart klopt snel
- Moeite met ademen
- Duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
- Zich verward voelen
- Minder alert of bewust zijn, in de war zijn, angstig zijn of problemen met het geheugen
- Moeite hebben met praten en/of begrijpen wat er gezegd wordt
- Langzamer bewegen, het handschrift wordt anders
- Minder coördinatie hebben; daardoor beweegt u anders en heeft u moeite met uw evenwicht
- Moeite hebben met lezen en schrijven, het is lastig om woorden te begrijpen
- Veranderingen in de persoonlijkheid, bijvoorbeeld: minder praten, geen zin meer hebben in activiteiten en de gezichtsuitdrukking wordt vlakker (minder emotie in het gezicht)

Wilt u meer informatie over uw medicijn?
Lees de bijsluiter of scan de QR-code voor het online materiaal. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.



versie 1.0

© Janssen-Cilag B.V., a Johnson & Johnson company –
CP-532394 – Approval date: 07-2025

Informatie die het zorgteam moet invullen

Geef deze kaart aan uw CAR-T-zorgteam. Zij vullen de informatie in en geven de kaart aan u terug.

OP (DATUM): _____

kreeg deze patiënt ciltacabtagene autoleucel, een chimere antigeenreceptor-T-celtherapie (CAR-T-celtherapie) voor multipel myeloom.

LOT (BATCHNUMMER): _____

Belangrijke informatie voor zorgverleners

Deze patiënt heeft gemanipuleerde autologe T-cellen gekregen wat kan leiden tot neurologische bijwerkingen en een ernstig, mogelijk levensbedreigend of dodelijk CRS. CRS kan elk orgaan-systeem betreffen. Beoordeel de patiënt op tekenen en symptomen van CRS en neurologische bijwerkingen, inclusief immuun-effectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom (ICANS).

Neem voordat u een behandeling start, contact op met de belangrijkste zorgverlener via het nummer op deze kaart. Deze patiënt mag geen bloed, organen, weefsels of cellen voor transplantatie doneren.

Zie de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) voor de volledige informatie.