

NL

Patiëntenkaart voor

NL - 1609531B

Topamax

topiramaat

Voor vrouwen en meisjes
die zwanger kunnen worden

Geboortebeperking en
voorkoming van zwangerschap

Wat moet u weten?

- Topamax is een geneesmiddel voor epilepsie en migraine.
- Topamax kan de gezondheid van een ongeboren kind ernstig schaden als het gebruikt wordt tijdens de zwangerschap.

Wat moet u doen?

- Lees vóór gebruik de bijsluiter en de patiëntengids zorgvuldig door.
- Gebruik tijdens uw behandeling met topiramaat en tot minstens 4 weken na uw laatste dosis topiramaat zeer effectieve voorbehoedsmiddelen. Uw arts zal u advies geven over de methode die voor u het meest geschikt is.

- Ga minstens eenmaal per jaar naar uw arts om uw behandeling opnieuw te beoordelen.
- Als u denkt dat u zwanger bent geworden, praat dan direct met uw arts.
- Als u zwanger wilt worden, stop dan niet met het gebruik van voorbehoedsmiddelen tot u met uw arts hebt gepraat.

- Als u epilepsie heeft, mag u niet stoppen met het gebruik van topiramaat tenzij uw arts zegt dat u dit moet doen, omdat uw aandoening anders erger kan worden.

Bewaar deze kaart.

Vraag aan uw arts om een patiëntengids of scan deze QR-code.

[https://www.janssen.com/netherlands/sites/
www_janssen_com_netherlands/files/topa
patiëntengids.pdf](https://www.janssen.com/netherlands/sites/www_janssen_com_netherlands/files/topa_patiëntengids.pdf)

Patiëntenkaart voor
Topamax
topiramaat