

Cartão do paciente

**TECVAYLI**<sup>®</sup>  
(teclistamabe)

Nome do paciente:

**Johnson & Johnson**

Nome do médico prescritor:

N.º de telefone do médico prescritor:

Nome e endereço do hospital:

N.º de telefone do hospital:

### INFORMAÇÃO PARA A EQUIPE DE CUIDADO DE SAÚDE PREENCHER

Por favor, forneça este cartão à sua equipe de cuidado à saúde para preencher as informações e te retornar com o cartão preenchido após administração de TECVAYLI® (teclistamabe).

### DATAS DAS DOSES DE TECVAYLI® (TECLISTAMABE) - CRONOGRAMA DE ESCALONAMENTO

Dose de escalonamento 1:

Dose de escalonamento 2:

1ª dose de tratamento:

# Atenção!



É importante que qualquer profissional da saúde que você tenha contato esteja ciente de que você está em tratamento com TECVAYLI® (teclistamabe).

Por isso, **leve este cartão sempre com você**. Principalmente caso você vá ao hospital.

---

O medicamento TECVAYLI® (teclistamabe) pode causar efeitos colaterais, como Síndrome de Liberação de Citocinas (CRS) e Síndrome Neurotóxica Associada a Células Imunoefetoras (ICANS).<sup>1</sup>

A Síndrome de Liberação de Citocinas é uma reação imune séria que pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo medicamentos como TECVAYLI® (teclistamabe).<sup>1,2</sup> ICANS são eventos adversos neurológicos causados por uma série de fatores, incluindo CRS.<sup>2,3</sup>

## Informação de segurança importante para pacientes

Você está em um tratamento para câncer e, por isso, é importante que esteja atento a alguns sinais e sintomas, principalmente nas primeiras semanas de tratamento.

Procure ajuda médica imediatamente caso você sinta:<sup>2,3,4</sup>

Febre (38°C ou mais)

Calafrios

Batimento acelerado

Dificuldade para respirar

Náusea

Dor de cabeça

Tontura

Pressão baixa

Os sintomas abaixo são mais relacionados com ICANS:

Confusão

Sentir-se menos alerta

Dificuldade de escrita



**Importante lembrar:** após a administração de cada uma das três primeiras doses (geralmente dentro do cronograma de escalonamento de dose), permaneça próximo, (ou seja, em até 30 minutos de distância) por pelo menos 48 horas, do local onde você recebeu a terapia com TECVAYLI® (teclistamabe).<sup>1</sup>

É recomendado que você esteja na **companhia de um adulto** competente para monitoramento diário.

Esses não são todos os efeitos colaterais do TECVAYLI® (teclistamabe). Caso tenha qualquer sintoma listado neste cartão, ligue para seu médico ou procure um pronto-socorro imediatamente.<sup>1</sup>

**Avise seu médico** caso você tenha qualquer outro sintoma/efeito colateral que te incomode ou que persista.<sup>1</sup>

# Informação de segurança importante aos profissionais de saúde

- ✓ CRS e ICANS, incluindo reações sérias ou com risco de vida, podem ocorrer em pacientes recebendo TECVAYLI® (teclistamabe).<sup>1</sup>
- ✓ A maioria dos eventos de CRS e ICANS observados após a administração de TECVAYLI® (teclistamabe) foram graus 1 e 2.<sup>5</sup>
- ✓ Síndrome de Liberação de Citocinas (SLC) pode envolver vários sistemas de órgãos.<sup>2</sup> Avalie o paciente para sinais e sintomas de CRS e ICANS. Se o seu paciente relatar ou apresentar quaisquer sinais ou sintomas, conforme referidos neste cartão, por favor, entre em contato com o médico prescritor do paciente imediatamente para mais informações.

Consulte a bula de TECVAYLI® (teclistamabe)  
para mais detalhes e informação de contato do fabricante.<sup>1</sup>



Este medicamento está sujeito a monitoramento adicional.  
Isso permitirá identificação mais rápida de novas informações de segurança.

## Referências

---

1. Bula de TECVAYLI® (teclistamabe).
2. Shimabukuro-Vornhagen A., et al. Cytokine release syndrome. *J Immunother Cancer*. 2018 Jun 15;6(1):56. Doi: 10.1186/s40425-018-0343-9.
3. Riegler L.L., et al. Current approaches in the grading and management of cytokine release syndrome after chimeric antigen receptor T-cell therapy. *Ther Clin Risk Manag*. 2019 Feb 28;15:323-335. Doi: 10.2147/TCRM.S150524.
4. Lee D.W., et al. ASTCT Consensus Grading for Cytokine Release Syndrome and Neurologic Toxicity Associated with Immune Effector Cells. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2019 Apr;25(4):625-638. doi: 10.1016/j.bbmt.2018.12.758.
5. Moreau P., et al. Teclistamab in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. *N Engl J Med*. 2022 Aug 11;387(6):495-505. doi: 10.1056/NEJMoa2203478. Epub 2022 Jun 5. PMID: 35661166.

**Contraindicações:** TECVAYLI® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao teclistamabe ou a qualquer um dos componentes na formulação. **Interações medicamentosas:** não foram realizados estudos de interação medicamentosa com TECVAYLI®.

**Johnson & Johnson**

Material destinado a pacientes que receberam  
a prescrição de TECVAYLI® (teclistamabe).  
Produzido em março de 2025. EM-134333.

**Innovative Medicine  
InfoCenter**

InfocenterBR@its.jnj.com  
0800 701 1851