

Cartão do Paciente Tratado com CARVYKTI® (ciltacabtageno autoleucel)

Você deve levar este cartão com você e compartilhar com todos os seus profissionais de saúde.

Nome do Paciente: _____

Nome do Cuidador: _____

Centro Performador: _____

Médico Responsável: _____

Navegador: _____

Telefone de Emergência: _____

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: _____

LEMBRETE IMPORTANTE: permaneça perto do local onde você recebeu sua infusão de CARVYKTI® por 14 dias. Caso você apresente **qualquer um** dos sintomas listados, ligue para o seu médico ou procure cuidados médicos de emergência imediatamente! Esses não são todos os possíveis eventos adversos de CARVYKTI®. Informe o seu médico caso você apresente algum evento adverso que te incomode ou que não melhore.

REFERÊNCIA: 1. CARVYKTI®, Bula do Medicamento.

Material destinado a pacientes que receberam a prescrição de CARVYKTI®. Produzido em fevereiro/2025. EM-147925.

Johnson & Johnson

**Innovative Medicine
InfoCenter**

InfocenterBR@its.jnj.com
0800 701 1851



Escaneie o QR Code para acessar a bula de CARVYKTI®

CARTÃO DO PACIENTE TRATADO COM CARVYKTI®



EM-147925. Data de elaboração: fevereiro/2025.
Este medicamento está sujeito a monitoramento adicional. Isso permitirá a rápida identificação de novas informações de segurança. Você pode ajudar ao relatar quaisquer efeitos colaterais que você possa apresentar.

ciltacabtageno
autoleucel
CARVYKTI®



Em caso de emergência, acione um dos contatos disponíveis em seu cartão. Procure atendimento médico imediato caso você apresente algum dos sintomas a seguir:¹

- Fraqueza nas pernas e braços com paralisia
- Febre (38°C ou mais)
- Arrepios ou calafrios
- Dificuldade para respirar
- Batimento cardíaco acelerado ou irregular
- Pressão arterial muito baixa
- Tontura ou atordoamento
- Dor muscular ou articular
- Confusão ou desorientação
- Dificuldade para falar, ler ou escrever
- Alterações de equilíbrio ou coordenação
- Dificuldade de movimentar músculos da face e dos olhos
- Dormência facial
- Formigamento, dormência e dor nas mãos e nos pés
- Movimentos mais lentos
- Pés arrastados ou passos pequenos ao caminhar
- Alterações de personalidade (p. ex., falar menos, desinteresse nas atividades)
- Dificuldade em sorrir, franzir o rosto ou demonstrar menos emoção
- Dificuldade para realizar tarefas simples (p. ex., vestir-se, alimentar-se)
- Perda de memória ou confusão mental
- Caligrafia menor
- Tremor

Informações para Profissionais de Saúde

O paciente identificado neste cartão recebeu infusão de CARVYKTI® (ciltacabtageno autoleucel).

O ciltacabtageno autoleucel **é um receptor de antígeno quimérico de células T (CAR-T)** para o tratamento de Mieloma Múltiplo direcionado a BCMA.¹

DATA DO TRATAMENTO COM CARVYKTI®:

____ / ____ / ____

Número do lote de CARVYKTI®:

Informações Específicas de Segurança sobre CARVYKTI® para Profissionais de Saúde

Após o tratamento com a terapia CAR-T, pode ocorrer síndrome de liberação de citocinas (SLC), que normalmente ocorre durante as primeiras semanas após a infusão.¹

O sintoma inicial da SLC induzida por CAR-T é normalmente febre. Sinais adicionais de SLC podem incluir hipóxia, hipotensão, taquicardia e lesão hepática.¹

Toxicidades neurológicas (com sintomas, como distúrbios de fala e linguagem, confusão, distúrbios de equilíbrio e movimento e alterações de personalidade, como ausência de emoções e apatia) podem ser observadas na presença ou na ausência da SLC e, algumas vezes, ocorrem após a resolução da SLC.¹

SLC e toxicidades neurológicas podem ser de risco à vida ou fatais e podem exigir tratamento médico imediato.¹

O recebimento de CARVYKTI® pode causar um resultado falso-positivo no teste de HIV em determinados testes rápidos de HIV comercialmente disponíveis.¹

Entre em contato imediatamente com o telefone de emergência 24 horas do centro performador de CAR-T caso ocorram efeitos colaterais.